



Институт за јавно здравје
Institute of public health
Instituti i shëndetit publik

Neoplazmat malinje problem i shëndetit publik ne jetesën bashkëkohore

Instituti për shëndet publik i Republikës së Maqedonisë

Mr d-r Vjosa Reçica

Qendra për përpunimin e të dhënave shëndetësore, publikim dhe informim



Faktoret e rezikut

Kanceri lind nga një qelizë e vetme. Transformimi i qelizave normale ne qeliza tumorale eshte nje proces multistage zakonisht progres nga lezione pre - kanceroze ne tumore malinje. Këto ndryshime janë rezultat i bashkëveprimit në mes të faktorëve gjenetik dhe të agjentëve të jashtëm e duke përfshirë faktoret :

Fizik: UV dhe rrezatimi jonizues

Kimik: asbesti , përbërësit e tymit të duhanit , aflatoxinat (ndotësit e ushqimit), arseniku(papastërtite e ujit të pijshëm) dhe

Biologjik: infeksionet nga viruset , bakteret e caktuara ose parazitët

Mosha, predispozita gjenetike



Faktoret e rezikut

Plakja është një tjetër faktor themelor për zhvillimin e kancerit .

Incidenca e kancerit të rritet paralelisht me moshën. Pirja e duhanit, konsumi i alkoolit, dietat jo te shendetshme dhe pasiviteti fizik janë faktorët kryesorë të rrezikut për rritjen e sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë në mesin e popullatës në botë

Infeksion kronik i virusit të hepatitit B (HBV) , virusi i hepatitit C (HCV) dhe disa lloje virusi te njeriu (HPV) janë faktorët kryesore te rrezikut për kancerin në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme. Neoplazma malinje e qafës së mitrës të shkaktuar nga HPV , eshte shkaku kryesor i vdekjes nga kanceri në mesin e grave në vendet me të ardhura të ulëta.



Институт за јавно здравје
Institute of public health
Instituti i shëndetit publik

Gjendja me neoplazmat malinje ne bote

Vlerësimet e GLOBOCAN 2012:

Kanceri është shkaku kryesor i vdekjeve në mbarë botën dhe shkakatar për 8,2 milion vdekje (rreth 14% të të gjitha vdekjeve) në vitin 2012
Në vitin 2012 ka rreth 14.100.000 raste të reja malinje dhe 32,6 milion njerëz me kancer (më shumë se 5 vjet te diagnostifikuar me kancer)
Tumoret malinje të mushkërive, stomakut, mëlçisë, zorrës së trashë dhe të gjirit janë shkaqet më të shpeshta të vdekjes çdo vit
Rreth 30% e vdekjeve nga neoplazmat malinje ndodhin për shkak të pesë faktorëve kryesorë të rrezikut: sjelljeve jo të shëndetshme dhe dietave jo te shendetshme, mbipeshes ,konsumit te manget te frutave dhe perimeve në dietë, mungesa e aktivitetit fizik, pirja e duhanit, konsumi i alkoolit etj .
Duhani është faktori më i rëndësishëm i rrezikut për kancerin dhe shkaku i 22% të të gjitha vdekjeve nga neoplazmat malinje dhe në 71% të të gjitha vdekjeve nga Neoplazma malinje e mushkërive.



Gjendja me neoplazmat malinje ne bote


- Përafërsisht rreth 66 % të totalit të vdekjeve nga neoplazmat malinje në vitin 2012 jane të regjistruara në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme
- Sipas vlerësimeve nga OBSH numri i vdekjeve nga kanceri në botë do të rritet në 13.100.000 ne vitin 2030
- Ne vend te parë në botë në vitin 2012 është: kanceri i mushkërve me incidence 13.0 % 000 , neoplazma malinje e mëlçisë me shkalle te incidencës 11.9 % 000 , neoplazma malinje e stomakut me shkalle te incidencës 9.7 % 000 etj.
- Numri i përgjithshëm i vdekjeve në rang të parëvjen nga kanceri i mushkërive ku Shkalla e vdekshmërisë sillet 19.4 % , e ndjekur nga kanceri i mëlçisë (9.1 % 000) , stomakut (8.8) etj .



Институт за јавно здравје
Institute of public health
Instituti i shëndetit publik

Gjendja me neoplazmat malinje ne bote

Shkalla e standardizuar e mortalitetit nga neoplazmat malinje ne botë,
në vitin 2012






Институт за јавно здравје
Institute of public health
Instituti i shëndetit publik

Gjendja me neoplazmat malinje ne bote

Incidenca nga neoplazmat malinje ne vitin 2012, shkalla ne
100 000 banore ne nivel global





Gjendja me neoplazmat malinje ne Maqedoni, morbiditeti


- Në Strukturën e grupeve më të shpeshta të sëmundjeve të trajtuara në veprimtarinë spitalore-stacionare në Maqedoni, neoplazmat malinje të zënë vendin e tretë me 11.0% të totalit të trajtuar në vitin 2016, pas sëmundjeve të sistemit respirator (17,1%) dhe sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut (13.1%).
- Në periudhën dhjetë-vjeçare, 2007-2016, në lëminë spitalore stacionare mesatarisht në vjet trajtohen 30103 pacientë që vuajnë nga neoplazmat malinje, me një mesatare vjetore rreth 12.3% të neoplazmave malinje të trajtuara në total.
- Në periudhën 2014-2016, në veprimtarinë spitalore -stacionare mesatarisht në vjet trajtohen 28.571 pacientë që diagnostifikohen me neoplazma malinje, me pjesëmarrje mesatare vjetore prej 11.2% të neoplazmave malinje të trajtuara në total.



Институт за јавно здравје
Institute of public health
Instituti i shëndetit publik


Morbiditeti Gjendja me neoplazmat malinje ne Maqedoni, morbiditeti

Struktura e grupeve me te shpeshta te semundjeve te trajtuara neper spitale, ne Republiken e Maqedonise ne vitin 2016






**Numri i të prekurve nga neoplazmat malinje ne republikën e Maqedonisë te
mjekuar në spitale në periudhën 2007-2016, (shkalla ne 10 000 banore)**





Gjendja me neoplazmat malinje ne Maqedoni, morbiditeti

Shkalla e përqindjes së neoplazmave malinje te pacientët e trajtuar në spitale në Maqedoni e llogaritur ne 10 000 banorë, në periudhën 2007-2016.






Институт за јавно здравје
Institute of public health
Instituti i shëndetit publik

Gjendja me neoplazmat malinje ne Maqedoni, morbiditeti

**Morbiditeti nga neoplazmat malinje sipas regjioneve ne Republiken
e Maqedonise ne vitin 2016**



Shpërndarja territoriale e normave të morbiditetit në 10 000 banorë të pacientëve të trajtuar në spitale sipas rajoneve statistikore në Maqedoni në vitin 2016.



Vdekshmëria nga neoplazmat malinje në Republikën e Maqedonisë


- Tumoret malinje janë shkaku i dytë i vdekjes në mesin e popullatës në vend me përfaqësim 19.0% në strukturën e vdekjeve të përgjithshme menjëherë pas sëmundjeve të sistemit të qarkullimit të gjakut me 53.5% në 2016.
- Në Maqedoni mesatarisht 3882 njerëz në vit vdesin nga neoplazmat malinje si shkak kryesor i vdekjeve. Vlera mesatare vjetore e neoplazmave malinje në totalin e të gjitha vdekjeve në periudhën e analizuar ka qene 19.0%.
- Në vitin 2016 në Republikën e Maqedonisë nga neoplazmat malinje kanë vdekur 3882 persona ose me shkallë vdekshmërie për persona 187,3 në 100,000 banorë.
- Numri është rritur 13.5% në krahasim me vitin 2006 kur janë regjistruar 3419 vdekje me normë prej 167,6 në 100.000 banorë. Në periudhën e analizuar 2006-2016, trendi i vdekshmërisë tregon një tendencë në rritje.



Институт за јавно здравје
Institute of public health
Instituti i shëndetit publik


Vdekshmëria nga neoplazmat malinje në Republikën e Maqedonisë

Shkalla e vdekshmerise ne 100 000 banore, nga neoplazmat
malinje në Republikën e Maqedonisë, periudha 2006-2016





Vdekshmeria ne 100 000 banore analizuar sipas shkaqeve me te shpeshta te vdekshmerise ne republiken e Maqedonise, ne vitin 2016






Институт за јавно здравје
Institute of public health
Instituti i shëndetit publik

Vdekshmëria nga neoplazmat malinje në Republikën e Maqedonisë sipas gjinise

Shkalla e vdekshmerise nga neoplazmat malinje sipas gjinise, e llogaritur ne 100000 banore ne Republiken e Maqedonise , periudha 2006-2016




Shpërndarja sipas gjinisë e numrit të vdekjeve nga neoplazmat malinje tregon tendencë pozitive të zhvillimit në të dy gjinitë. Normat e vdekshmërisë janë më të larta tek meshkujt.



Институт за јавно здравје
Institute of public health
Instituti i shëndetit publik

Vdekshmëria nga neoplazmat malinje në Republikën e Maqedonisë sipas moshes, 2010-2016




Vdekshmëria nga neoplazmat malinje rritet paralelisht me moshën. Frekuenca më e madhe e regjistruar e vdekjeve nga neoplazmat malinje si shkaku kryesor i vdekjes verehet te moshat mbi 45 vjet. Më shumë se gjysma e vdekjeve nga neoplazmat malinje janë të moshës mbi 65 vjeçe, me përfaqësim 57.7 % të totalit të vdekjeve nga neoplazmat malinje në vitin 2016.



Vdekshmëria nga neoplazmat malinje në Republikën e Maqedonisë

Gjendja me neoplazmat malinje sipas lokalizimit te tyre ne Republiken e Maqedonise, shkalla e vdekshmerise ne 100 000 banore, ne vitin 2016




Për sa i përket strukturës sipas shkaqeve më të zakonshme të vdekjeve sipas diagnozave individuale, te meshkujt në vend të parë radhitet neoplazma malinje e mushkërive me normë më të lartë të vdekshmërisë prej 67.7 vdekje për 100,000 banorë në vitin 2015.



Институт за јавно здравје
Institute of public health
Instituti i shëndetit publik

Vdekshmëria nga neoplazmat malinje në Republikën e Maqedonisë

Vdekshmëria nga neoplazma malinje te bronkut dhe mushkerive, shkalla ne 100 000 banore në Republikën e Maqedonisë, sipas lokalizimit te neoplazmave malinje, periudha 2013-2016




Sipas analizës nga shkaqet më të zakonshme të vdekjeve nga neoplazmat malinje sipas diagnozave më të shpeshta janë rastet me cancer të mushkërive me shkallën më të lartë të vdekshmërisë me 43,7 % ooo në vitin 2016



Институт за јавно здравје
Institute of public health
Instituti i shëndetit publik

Vdekshmëria nga neoplazmat malinje në Republikën e Maqedonisë, 2016

**Gjendja me neoplazmat malinje te gjinia mashkullore, shkalla e
vdekshmerise ne 100 000 banore ne vitin 2016**






Институт за јавно здравје
Institute of public health
Instituti i shëndetit publik

Vdekshmëria nga neoplazmat malinje në Republikën e Maqedonisë, 2016


Mortaliteti nga neoplazmat malinje te bronkut dhe mushkërive te meshkujt në
Republikën e Maqedonisë periudha 2013-2016, shkalla në 100 000 banorë





Vdekshmëria nga neoplazma malinje e gjirit te femrat , shkalla ne 100 000 banore në Republikën e Maqedonisë, periudha 2013-2016


Shkalla e vdekshmërisë nga kanceri i gjirit te femrat, shkalla në 100 000 banorë



Te femrat si shkakun më të shpeshtë të vdekjeve në rang të parë radhëtar kanceri i gjirit me normën më të lartë të vdekshmërisë prej 32,7% ooo, pra në vitin 2016 kanceri i gjirit ishte shkakun kryesor të vdekjes.



Shkalla e vdekshmërisë /100 000 banorë të femrat, sipas shkaqeve më të shpeshta të vdekjes nga neoplazmat malinje në vitin 2016






Институт за јавно здравје
Institute of public health
Instituti i shëndetit publik

Vdekshmëria nga neoplazmat malinje në Republikën e Maqedonisë sipas regjioneve statistikore

**Mortaliteti nga neoplazmat malinje sipas regjioneve ne Republikën
e Maqedonise ne vitin 2016, shkalla ne 100 000 banorë**





Rekomandime

Aplikimi dhe zbatimi i veprimeve parandaluese:

Skriningu dhe zbulimi i hershëm, ndryshimi i stilit jetesor të popullates i lidhur me rrezikun ndaj sëmundjeve malinje (dieta te shendetshme , ndalimi ose reduktimi i pirjes se duhanit, alkoolit etj.) aktiviteti fizik, kontaktet seksuale te mbrojtura).

Reduktimi i faktorëve të tjerë të rrezikut,

Përmirësimi dhënave per evidentimin e semundjeve malinje

Sistemi shëndetësor i integruar i regjistrimit,

Kryerja e aktiviteteve promovuese

Mbështetja nga organizatat ndërkombëtare dhe vendore për kërkime shkencore në këtë fushë dhe zbatimi i programeve të parandalimit