


MORTALITETI NGA NEOPLAZMAT MALINJE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

Neoplazmat malinje janë ndër shkaktarët më të shpeshtë të vdekjes në mbarë botën. Në R. e Maqedonisë pas sëmundjeve të sistemit të qarkullimit të gjakut, neoplazmat malinje zënë vendin e dytë si shkaku më i shpeshtë i vdekjes. Në periudhën 2010-2024 shkalla e mortalitetit sillet nga 180,3 në 100 000 banorë në vitin 2010 deri më 217,0‰000 në vitin 2024.


Diagrami 1: Shkalla e mortalitetit nga neoplazmat malinje në R. e Maqedonisë së Veriut, 2010 - 2024



Burimi: Enti Shtetëror i Statistikës i RM-së
Përpunoi: Instituti i Shëndetit Publik i RM-së

Shkalla e mortalitetit nga neoplazmat malinje tek meshkujt është më e lartë se tek femrat.

Diagrami 2: Shkalla e mortalitetit nga neoplazmat malinje sipas gjinisë në R. e Maqedonisë, 2010 - 2024




Burimi: Enti Shtetëror i Statistikës i RM-së
Përpunoi: Instituti i Shëndetit Publik i RM-së

Mortaliteti nga neoplazmat malinje tek grupmosha mbi 65 vjet

Në periudhën 2010-2024 shkalla e mortalitetit nga neoplazmat malinje tek grupmosha mbi 65 vjet oscilon dhe sillet nga 881,1 në vitin 2010 deri më 821,3 në vitin 2024 në 100 000 banorë.


Diagrami 3: Shkalla e mortalitetit nga neoplazmat malinje në R. e Maqedonisë tek grupmosha mbi 65 vjet, 2010 - 2024



Burimi: Enti Shtetëror i Statistikës i RM-së
Përpunoi: Instituti i Shëndetit Publik i RM-së

Shkalla e mortalitetit nga neoplazmat malinje tek grupmosha mbi 65 vjet është më e lartë tek meshkujt.

Diagrami 4: Shkalla e mortalitetit nga neoplazmat malinje në R. e Maqedonisë tek grupmosha mbi 65 vjet sipas gjinisë, 2010 - 2024




Burimi: Enti Shtetëror i Statistikës i RM-së
Përpunoi: Instituti i Shëndetit Publik i RM-së

Mortaliteti nga neoplazmat malinje tek grupmosha 0-64 vjet

Shkalla e mortalitetit nga neoplazmat malinje tek grupmosha 0-64 vjet është dukshëm më e ulët se shkalla e mortalitetit tek grupmosha mbi 65 vjet.


Diagrami 5: Shkalla e mortalitetit nga neoplazmat malinje në R. e Maqedonisë tek grupmosha 0-64 vjet, 2010 - 2024



Burimi: Enti Shtetëror i Statistikës i RM-së
Përpunoi: Instituti i Shëndetit Publik i RM-së

Edhe tek grupmosha 0-64 vjet mortaliteti është më i lartë tek meshkujt se sa tek femrat.

Diagrami 6: Shkalla e mortalitetit nga neoplazmat malinje në R. e Maqedonisë së Veriut tek grupmosha 0-64 vjet sipas gjinisë, 2010 - 2024




Burimi: Enti Shtetëror i Statistikës i RM-së
Përpunoi: Instituti i Shëndetit Publik i RM-së

Lokalizimet më të shpeshta primare të neoplazmave malinje

Tek meshkujt, shkaku më i shpeshtë i vdekjes nga neoplazmat malinje në periudhën 2010-2024, janë neoplazmat malinje të bronkeve dhe mushkërive me një shkallë e cila sillet nga 64,8 në vitin 2010 deri më 58,2 në vitin 2017, 56,1 në vitin 2021, 68,3 në vitin 2023 dhe 71,3 në 100 000 meshkuj në vitin 2024.


Diagrami 7: Shkalla e mortalitetit nga neoplazma malinje të bronkeve dhe mushkërive tek meshkujt në R. e Maqedonisë, 2010 - 2024



Burimi: Enti Shtetëror i Statistikës i RM-së
Përpunoi: Instituti i Shëndetit Publik i RM-së

Tek femrat shkaku më i shpeshtë i vdekjes nga neoplazma malinje në periudhën 2010-2024 është neoplazma malinje e gjirit. Shkalla e mortalitetit sillet nga 30,0 në vitin 2010, 32,6 në vitin 2021, 38,5 në vitin 2022 dhe 39,4 në 100 000 femra në vitin 2024.

Diagrami 8: Shkalla e mortalitetit nga neoplazma malinje e gjirit tek femrat në R. e Maqedonisë, 2010 - 2024



Burimi: Enti Shtetëror i Statistikës i RM-së
Përpunoi: Instituti i Shëndetit Publik i RM-së